

**Updated Symptom Guidance From California Department of Public Health
October 2023**

Sign/Symptom	Symptom definition and additional criteria for when the child should stay home
<p>Abdominal pain / Stomachache</p> 	<p>Definition: Pain experienced anywhere between the chest and groin; pain may be continuous or may come and go.</p> <p>May attend school or child care unless the child has one of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pain is severe enough that child has difficulty participating in routine activities ● Pain starts after an injury ● Bloody or black stools ● Diarrhea (see Diarrhea) ● Vomiting (see Vomiting) ● No urine for 8 hours (dry diaper, or ask older children if they have urinated since they woke up) ● Fever (see “Fever” for return guidance)
<p>Cough and cold symptoms</p>  	<p>Definition: May include runny/stuffy nose, sore throat, sneezing, congestion, body aches, and/or cough, typically lasting up to 7–10 days.</p> <p>May attend school or child care unless the child has one of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fever (see “Fever” for return guidance) ● Difficulty with or rapid rate of breathing (see “Difficult or noisy breathing”) ● Cough is severe or child cannot catch breath after coughing ● For a cough suspected to be associated with asthma: coughing that cannot be controlled by the medications that the child care or school has been instructed to use


**Updated Symptom Guidance From California Department of Public Health
October 2023**

Sign/Symptom	Symptom definition and additional criteria for when the child should stay home
<p>Diarrhea</p>  	<p>Definition: Stools that are more frequent (typically at least two more than normal) or less formed than usual <i>for that child</i> AND not associated with a change in diet. Note that young infants may normally have frequent, somewhat watery stools, particularly if breastfed.</p> <p>May attend* school or child care unless the child has one of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Stool not contained in the diaper or toilet (when toilet-trained) ● Stool looks like it contains blood or mucus, or appears like sticky black tar ● Yellow skin/eyes (jaundice) ● Diarrhea that occurs during an outbreak, and exclusion is recommended by the local health department <p>*Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>If the child has been diagnosed with a specific infection (such as Shigella, Salmonella/typhoid, Shiga toxin-producing E. Coli, norovirus (PDF), etc.), follow the advice of the local health department if they are involved, or the guidance of the child's health care professional.</i> ● <i>If there is concern for an outbreak (more persons with diarrhea than would be expected in the setting for that time of year), contact the local health department for guidance.</i>

**Updated Symptom Guidance From California Department of Public Health
October 2023**

Sign/Symptom	Symptom definition and additional criteria for when the child should stay home
<p>Difficult or noisy breathing</p>  	<p>Definition: Wheezing (high-pitched sounds) that can be heard when a child breathes in or out, chest retractions (see below) OR extra effort is required to breathe.</p> <p>May attend school or child care unless the child has one of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Wheezing that is new for the child or cannot be controlled by medications the child care/school has been instructed to use for known conditions (e.g., asthma plan) ● Skin or lips seem purple, blue, or grey, depending on skin tone. ● Fever (see “Fever” for return guidance) ● Behavior changes ● Very rapid breathing or increased effort to breathe, such as chest retractions (space between ribs sinks with each breath), belly breathing (belly goes up and down with breathing) ● Breathing problem that causes child to have pursed lips, difficulty speaking, or difficulty feeding <p>Note: Seek medical attention for new symptoms such as wheezing or breathing difficulties, even if mild.</p>
<p>Earache</p> 	<p>Definition: Pain (dull, sharp, or burning sensation) experienced inside the ear.</p> <p>May attend school or child care unless the child has one of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fever (see “Fever” for return guidance) ● Behavior changes ● Pain prevents participation in routine activities

Updated Symptom Guidance From California Department of Public Health
October 2023

Sign/Symptom	Symptom definition and additional criteria for when the child should stay home
<p data-bbox="199 342 407 447">Eye irritation, pink eye, or drainage</p>  	<p data-bbox="496 342 1409 447">Definition: Red or pink appearance to the white part of the eyeball. Child’s eye may also be itchy, have crusted/matted eyelashes, more watering than normal, or yellow/white drainage.</p> <p data-bbox="496 478 1398 548">May attend school or child care unless the child has one of the following:</p> <ul data-bbox="548 579 1292 779" style="list-style-type: none">● Problems seeing (vision changes)● An injury to the eye involving forceful impact to or penetration of the eye● Pain or discomfort the child cannot tolerate <p data-bbox="496 810 1419 1098">Note: <i>Pink eye (i.e., conjunctivitis) is inflammation of a layer that covers much of the eyeball. It is most often caused by a virus, and children with viral pink eye typically get better after 5-6 days without antibiotics. Staying home from school or child care is not necessary. Frequent hand washing should be encouraged. Eye irritation can also result from allergies or chemical exposures (e.g., air pollution, smoke, or swimming in chlorinated pool water).</i></p>

**Updated Symptom Guidance From California Department of Public Health
October 2023**

Sign/Symptom	Symptom definition and additional criteria for when the child should stay home
<p>Fever</p> 	<p>Definition: An oral (under the tongue), temporal (forehead), rectal, or axillary (underarm) temperature above 100.4°F (38°C). Axillary (underarm) measurements should be used only if other options are not available. Follow instructions for the specific thermometer, including directions for use, cleaning and covers (if applicable). If a temperature is close to 100.4°F, repeat to confirm the result.</p> <p>It is <u>ONLY</u> recommended to take a child’s temperature if the child seems ill, feels hot, or has other symptoms or signs of illness. Checking the temperature of a child or group of children to allow entry (also known as screening) is NOT recommended in school or child care settings.</p> <p>Unless otherwise directed by a healthcare provider, a child with another symptom or sign of illness who also has a fever should NOT attend school or child care.</p> <p>Return when:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fever went away in the night – without using fever reducing medications, e.g., Tylenol®, Advil®, Motrin® (acetaminophen or ibuprofen) - and is still gone in the morning; AND ● Other symptoms are improving and the child can participate comfortably in routine activities.

Updated Symptom Guidance From California Department of Public Health
October 2023

Sign/Symptom	Symptom definition and additional criteria for when the child should stay home
<p data-bbox="198 338 482 411">Headache, stiff or painful neck</p>  An illustration of a young boy with brown hair, wearing a red shirt, holding his hands to his head in a circular frame. A red spiral icon is on his forehead, indicating a headache.	<p data-bbox="495 338 1365 411">Definition: Pain experienced in any part of the head ranging from sharp to dull; may occur along with other symptoms.</p> <p data-bbox="495 436 1398 510">May attend school or child care unless the child has one of the following:</p> <ul data-bbox="548 541 1409 968" style="list-style-type: none"><li data-bbox="548 541 1409 653">● Concussion symptoms: Pain occurs after a fall or other injury to the head and is severe or associated with vomiting, vision changes, behavior change, or confusion.<li data-bbox="548 678 1409 968">● Possible infection: Stiff neck, headache and fever can be symptoms of meningitis a potentially serious infection. Meningitis can also cause sensitivity to light, vomiting, and/or confusion. A stiff neck is most concerning if the child can't look at their belly button (putting chin to chest) due to pain or the BACK of the neck is painful (not soreness in the sides) along with the other symptoms above. <p data-bbox="542 995 1382 1068">Get immediate medical attention for either of the above conditions.</p>

**Updated Symptom Guidance From California Department of Public Health
October 2023**

Sign/Symptom	Symptom definition and additional criteria for when the child should stay home
<p>Rash or itching</p> 	<p>Definition: An area of the skin that has changes in color or texture and may look inflamed or irritated. The skin may be darker than or lighter than normal or red or purple. It may be warm, scaly, bumpy, dry, itchy, swollen, or painful. It may also crack or blister.</p> <p>May attend school or child care unless the child has one of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Oozing, open wound or infection that cannot be covered and is in an area that might come in contact with others. ● Skin that looks bruised without a known injury or in an unusual location. ● Rapidly spreading dark red or purple rash (may indicate a rare but severe bacterial infection; usually accompanied by fever). ● Tender, red area of skin, rapidly increasing in size or tenderness. ● Associated symptoms of a serious allergic reaction (rash with throat closing, abdominal pain, vomiting, or wheezing). ● Fever (see Fever for return guidance) ● There is concern for a disease like chickenpox or measles. If this is the case, the child should see a healthcare provider and the local health department should be contacted. <p>Note: For diagnosed conditions, follow the advice of the healthcare provider. In general, for conditions such as lice, impetigo, ringworm, scabies, and pinworms, no waiting period is typically necessary after starting treatment and the child may return after the appropriate treatment is started.</p>

**Updated Symptom Guidance From California Department of Public Health
October 2023**

Sign/Symptom	Symptom definition and additional criteria for when the child should stay home
<p>Sore throat (pharyngitis) and/or mouth sores</p>  	<p>Definition: Sore throat includes pain or irritation of the throat often resulting from a viral or bacterial infection (e.g., cold, flu, strep throat). May feel worse when swallowing.</p> <p>Mouth sores include white patches on the tongue, gums and/or inner cheeks (oral thrush/yeast infection); white/red spots in the mouth, blisters on lips or inside mouth; or painful ulcers inside cheeks or on gums (canker sores).</p> <p>May attend school or child care unless the child has one of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Inability to swallow ● Fever (see “Fever” for return guidance) ● Breathing difficulties ● Excessive drooling or muffled voice <p>Note: Most children with sore throat have viral infections. Children younger than 3 years of age usually do not have strep throat. If a child is diagnosed with strep throat, they should receive antibiotics for at least 12 hours before returning.</p>

**Updated Symptom Guidance From California Department of Public Health
October 2023**

Sign/Symptom	Symptom definition and additional criteria for when the child should stay home
<p>Vomiting</p>  	<p>Definition: Forceful expelling of stomach contents out of the mouth 2 times or more in 24 hours.</p> <p>Note: Not all vomiting is due to an infection and other causes (e.g., spit-up in a healthy infant with reflux, motion sickness, overeating) should be considered.</p> <p>May attend school or child care unless the child has one of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Vomiting has occurred 2 or more times in 24 hours. ● Fever (see “Fever” for return guidance). ● Concern for a serious allergic reaction, such as hives appearing with vomiting. ● Vomit appears green or bloody ● Child has not urinated in the past 8 hours (i.e., has dry diapers, or ask older children). ● Recent head injury. ● Looks or acts very ill. <p>Return when:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Vomiting ended during the night and child is able to hold down food or liquids in the morning. <p>Note: <i>If there is concern for an outbreak (more persons with vomiting than would be expected in the setting for that time of year), contact the local health department as norovirus (PDF) should be suspected and children should not return until 48 hours after symptoms have resolved.</i></p>

Updated Symptom Guidance From California Department of Public Health October 2023

Signo/Síntoma	Definición de síntomas y criterios adicionales sobre cuándo el niño debe quedarse en casa
<p>Dolor abdominal / Dolor de estómago</p> 	<p>Definición: Dolor experimentado en cualquier parte entre el pecho y la ingle; El dolor puede ser continuo o aparecer y desaparecer.</p> <p>Puede asistir a la escuela o guardería a menos que el niño tenga uno de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El dolor es lo suficientemente intenso como para que el niño tenga dificultades para participar en actividades de rutina. • El dolor comienza después de una lesión. • Heces con sangre o negras • Diarrea (ver Diarrea) • Vómitos (ver Vómitos) • No orinar durante 8 horas (secar el pañal o preguntar a los niños mayores si han orinado desde que se despertaron) • Fiebre (consulte “Fiebre” para obtener orientación sobre el regreso)
<p>Síntomas de tos y resfriado</p>  	<p>Definición: Puede incluir secreción/congestión nasal, dolor de garganta, estornudos, congestión, dolores corporales y/o tos, y suele durar entre 7 y 10 días.</p> <p>Puede asistir a la escuela o guardería a menos que el niño tenga uno de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiebre (consulte “Fiebre” para obtener orientación sobre el regreso) • Dificultad o frecuencia respiratoria rápida (consulte “Respiración difícil o ruidosa”) • La tos es intensa o el niño no puede respirar después de toser. • Para una tos que se sospecha está asociada con el asma: tos que no puede controlarse con los medicamentos que la guardería o la escuela han recibido instrucciones de usar.

Updated Symptom Guidance From California Department of Public Health October 2023

Signo/Síntoma	Definición de síntomas y criterios adicionales sobre cuándo el niño debe quedarse en casa
<p data-bbox="105 325 219 357">Diarrea</p>  	<p data-bbox="474 325 1507 506">Definición: Deposiciones que son más frecuentes (normalmente al menos dos más de lo normal) o menos formadas de lo habitual <i>para ese niño</i> Y no asociadas con un cambio en la dieta. Tenga en cuenta que los bebés pequeños normalmente pueden tener deposiciones frecuentes y algo acuosas, especialmente si son amamantados.</p> <p data-bbox="474 520 1435 590">Puede asistir* a la escuela o a la guardería a menos que el niño tenga uno de los siguientes:</p> <ul data-bbox="522 604 1500 884" style="list-style-type: none">• Heces no contenidas en el pañal o en el inodoro (cuando se sabe ir al baño)• Las heces parecen contener sangre o moco, o parecen alquitrán negro y pegajoso.• Piel/ojos amarillos (ictericia)• Diarrea que ocurre durante un brote y el departamento de salud local recomienda su exclusión. <p data-bbox="474 898 578 930">* Nota:</p> <ul data-bbox="522 947 1507 1247" style="list-style-type: none">• <i>Si al niño se le ha diagnosticado una infección específica (como <i>Shigella</i>, <i>Salmonella/tifoidea</i>, <i>E. coli</i> productora de toxina Shiga, <i>norovirus</i> (PDF), etc.), siga los consejos del departamento de salud local si están involucrados, o la orientación del profesional de atención médica del niño.</i>• <i>Si existe preocupación por un brote (más personas con diarrea de lo que se esperaría en esa época del año), comuníquese con el departamento de salud local para obtener orientación.</i>

Updated Symptom Guidance From California Department of Public Health October 2023

Signo/Síntoma	Definición de síntomas y criterios adicionales sobre cuándo el niño debe quedarse en casa
<p>Respiración difícil o ruidosa</p>  	<p>Definición: Sibilancias (sonidos agudos) que se pueden escuchar cuando un niño inhala o exhala, retracciones del pecho (ver a continuación) O se requiere un esfuerzo adicional para respirar.</p> <p>Puede asistir a la escuela o guardería a menos que el niño tenga uno de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sibilancias que son nuevas para el niño o que no pueden controlarse con medicamentos que la guardería o la escuela han recibido instrucciones de usar para afecciones conocidas (p. ej., plan para el asma) • La piel o los labios parecen morados, azules o grises, según el tono de piel. • Fiebre (consulte “Fiebre” para obtener orientación sobre el regreso) • Cambios de comportamiento • Respiración muy rápida o mayor esfuerzo para respirar, como retracciones del pecho (el espacio entre las costillas se hunde con cada respiración), respiración abdominal (el abdomen sube y baja con la respiración) • Problema respiratorio que hace que el niño tenga los labios fruncidos, dificultad para hablar o dificultad para alimentarse. <p>Nota: busque atención médica si presenta síntomas nuevos, como sibilancias o dificultades respiratorias, incluso si son leves.</p>
<p>Dolor de oído</p> 	<p>Definición: Dolor (sensación sorda, aguda o de ardor) que se experimenta dentro del oído.</p> <p>Puede asistir a la escuela o guardería a menos que el niño tenga uno de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiebre (consulte “Fiebre” para obtener orientación sobre el regreso) • Cambios de comportamiento • El dolor impide la participación en actividades rutinarias

Updated Symptom Guidance From California Department of Public Health October 2023

Signo/Síntoma	Definición de síntomas y criterios adicionales sobre cuándo el niño debe quedarse en casa
<p>Irritación ocular, conjuntivitis o secreción</p> 	<p>Definición: Aspecto rojo o rosado de la parte blanca del globo ocular. El ojo del niño también puede tener picazón, pestañas con costras/enmarañadas, más lagrimeo de lo normal o drenaje amarillo/blanco.</p> <p>Puede asistir a la escuela o guardería a menos que el niño tenga uno de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Problemas para ver (cambios en la visión) • Una lesión en el ojo que implica un impacto fuerte o una penetración en el ojo. • Dolor o malestar que el niño no puede tolerar. <p><i>Nota: La conjuntivitis (es decir, conjuntivitis) es la inflamación de una capa que cubre gran parte del globo ocular. La mayoría de las veces es causada por un virus y los niños con conjuntivitis viral generalmente mejoran después de 5 a 6 días sin antibióticos. No es necesario quedarse en casa y no ir a la escuela ni a la guardería. Se debe fomentar el lavado frecuente de manos. La irritación de los ojos también puede deberse a alergias o exposición a sustancias químicas (p. ej., contaminación del aire, humo o nadar en agua de piscina clorada).</i></p>
<p>Fiebre</p> 	<p>Definición: Temperatura oral (debajo de la lengua), temporal (frente), rectal o axilar (axilas) superior a 100,4 °F (38 °C). Las mediciones axilares (axilas) deben usarse sólo si no hay otras opciones disponibles. Siga las instrucciones del termómetro específico, incluidas las instrucciones de uso, limpieza y cubiertas (si corresponde). Si la temperatura está cerca de 100,4°F, repita para confirmar el resultado.</p> <p>SÓLO se recomienda tomar la temperatura de un niño si parece enfermo, siente calor o tiene otros síntomas o signos de enfermedad. NO se recomienda verificar la temperatura de un niño o grupo de niños para permitir la entrada (también conocido como control) en la escuela o en entornos de guardería.</p> <p>A menos que un proveedor de atención médica indique lo contrario, un niño con otro síntoma o signo de enfermedad que también tenga fiebre NO debe asistir a la escuela ni a la guardería.</p> <p>Regresar cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fiebre desapareció durante la noche, sin usar medicamentos para reducir la fiebre, por ejemplo, Tylenol®, Advil®, Motrin® (acetaminofén o ibuprofeno), y todavía desaparece por la mañana; Y • Otros síntomas están mejorando y el niño puede participar cómodamente en las actividades rutinarias.

Updated Symptom Guidance From California Department of Public Health October 2023

Signo/Síntoma	Definición de síntomas y criterios adicionales sobre cuándo el niño debe quedarse en casa
<p data-bbox="107 331 407 436">Dolor de cabeza, rigidez o dolor en el cuello.</p>  A circular illustration of a young boy with brown hair and a red shirt, holding his hands to his head in a distressed expression. A red spiral icon is on his forehead, indicating a headache.	<p data-bbox="472 331 1503 401">Definición: Dolor experimentado en cualquier parte de la cabeza, desde agudo hasta sordo; puede ocurrir junto con otros síntomas.</p> <p data-bbox="472 415 1455 485">Puede asistir a la escuela o guardería a menos que el niño tenga uno de los siguientes :</p> <ul data-bbox="521 499 1511 940" style="list-style-type: none"><li data-bbox="521 499 1511 646">• Síntomas de conmoción cerebral: el dolor ocurre después de una caída u otra lesión en la cabeza y es severo o está asociado con vómitos, cambios en la visión, cambios de comportamiento o confusión.<li data-bbox="521 653 1511 940">• Posible infección: La rigidez del cuello, el dolor de cabeza y la fiebre pueden ser síntomas de meningitis, una infección potencialmente grave. La meningitis también puede causar sensibilidad a la luz, vómitos y/o confusión. La rigidez del cuello es más preocupante si el niño no puede mirar su ombligo (poniendo la barbilla contra el pecho) debido al dolor o si la PARTE POSTERIOR del cuello le duele (no dolor en los costados) junto con los otros síntomas mencionados anteriormente. <p data-bbox="488 955 1279 1024">Obtenga atención médica inmediata para cualquiera de las condiciones anteriores.</p> 

Updated Symptom Guidance From California Department of Public Health October 2023

Signo/Síntoma	Definición de síntomas y criterios adicionales sobre cuándo el niño debe quedarse en casa
<p>Erupción o picazón</p> 	<p>Definición: Un área de la piel que tiene cambios de color o textura y puede verse inflamada o irritada. La piel puede ser más oscura o más clara de lo normal o roja o morada. Puede ser cálido, escamoso, lleno de bultos, seco, con picazón, hinchado o doloroso. También puede agrietarse o ampollarse.</p> <p>Puede asistir a la escuela o guardería a menos que el niño tenga uno de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supuración, herida abierta o infección que no se puede cubrir y se encuentra en un área que podría entrar en contacto con otras personas. • Piel que parece magullada sin una lesión conocida o en una ubicación inusual. • Erupción de color rojo oscuro o púrpura que se propaga rápidamente (puede indicar una infección bacteriana rara pero grave; generalmente acompañada de fiebre). • Área sensible y enrojecida de la piel, que aumenta rápidamente de tamaño o sensibilidad. •  Síntomas asociados de una reacción alérgica grave (sarpullido con cierre de garganta, dolor abdominal, vómitos o sibilancias). • Fiebre (consulte Fiebre para obtener orientación sobre el regreso) • Existe preocupación por enfermedades como la varicela o el sarampión. Si este es el caso, el niño debe consultar a un proveedor de atención médica y comunicarse con el departamento de salud local. <p>Nota: <i>Para condiciones diagnosticadas, siga los consejos del proveedor de atención médica. En general, para afecciones como piojos, impétigo, tiña, sarna y oxiuros, normalmente no es necesario un período de espera después de comenzar el tratamiento y el niño puede regresar después de iniciar el tratamiento adecuado.</i></p>

Updated Symptom Guidance From California Department of Public Health October 2023

Signo/Síntoma	Definición de síntomas y criterios adicionales sobre cuándo el niño debe quedarse en casa
<p data-bbox="107 331 418 436">Dolor de garganta (faringitis) y/o llagas en la boca</p>  	<p data-bbox="470 331 1515 436">Definición: El dolor de garganta incluye dolor o irritación de la garganta que a menudo resulta de una infección viral o bacteriana (p. ej., resfriado, gripe, faringitis estreptocócica). Puede sentirse peor al tragar.</p> <p data-bbox="470 449 1503 594">Las llagas en la boca incluyen manchas blancas en la lengua, las encías y/o la parte interna de las mejillas (aftas orales/candidiasis); manchas blancas/rojas en la boca, ampollas en los labios o dentro de la boca; o úlceras dolorosas dentro de las mejillas o en las encías (aftas).</p> <p data-bbox="470 606 1455 678">Puede asistir a la escuela o guardería a menos que el niño tenga uno de los siguientes:</p> <ul data-bbox="521 690 1398 905" style="list-style-type: none"><li data-bbox="521 690 911 726">• Incapacidad para tragar<li data-bbox="521 737 1398 808">• Fiebre (consulte “Fiebre” para obtener orientación sobre el regreso)<li data-bbox="521 819 922 854">• dificultades para respirar<li data-bbox="521 865 1013 905">• Babeo excesivo o voz apagada <p data-bbox="470 917 1479 1062">Nota: la mayoría de los niños con dolor de garganta tienen infecciones virales. Los niños menores de 3 años generalmente no tienen faringitis estreptocócica. Si a un niño se le diagnostica faringitis estreptocócica, debe recibir antibióticos durante al menos 12 horas antes de regresar.</p>

Updated Symptom Guidance From California Department of Public Health October 2023

Signo/Síntoma	Definición de síntomas y criterios adicionales sobre cuándo el niño debe quedarse en casa
<p>Vómitos</p>  	<p>Definición: Expulsión forzada del contenido del estómago fuera de la boca 2 veces o más en 24 horas.</p> <p>Nota: No todos los vómitos se deben a una infección y se deben considerar otras causas (p. ej., regurgitación en un bebé sano con reflujo, mareos, comer en exceso).</p> <p>Puede asistir a la escuela o guardería a menos que el niño tenga uno de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha habido vómitos 2 o más veces en 24 horas. • Fiebre (consulte “Fiebre” para obtener orientación sobre el regreso). • Preocupación por una reacción alérgica grave, como urticaria que aparece con vómitos. • El vómito aparece verde o con sangre. • El niño no ha orinado en las últimas 8 horas (es decir, tiene pañales secos o pregunta a niños mayores). • Lesión reciente en la cabeza. • Parece o actúa muy enfermo. <p>Regresar cuando :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los vómitos cesaron durante la noche y el niño puede retener alimentos o líquidos por la mañana. <p>Nota: Si existe preocupación por un brote (más personas con vómitos de lo que se esperaría en el entorno para esa época del año), comuníquese con el departamento de salud local ya que se debe sospechar norovirus (PDF) y los niños no deben regresar hasta 48 horas después. los síntomas se han resuelto.</p>